

Patientvejledning

Afføringsprøve

Diarréudredning



MAVETARM
SUNDHED

Formålet med undersøgelsen er at kontrollere, om din diarré skyldes sygdomsfremmende mikrober i din tarm.

Forberedelse til undersøgelsen

Du kan drikke og spise, som du plejer.

Sådan foregår prøvetagningen

Du får udleveret:

- En pose med to stk. plastikrør – et rør til prøvemateriale og et til transport. Der er en strejkode på plastikrøret til transport, der passer til følgesedlen.
- En følgeseddel.
- Et easysampler sæt.
- En foret og frankeret konvolut.

Easysamplers sættet placeres på toilettet (se vejledning i det udleverede materiale) og benyttes til opsamling af afføringen.

1. Tag med skeen i prøverøret en prøve af din afføring. Er afføringen vandtynd eller med slim, pus eller blod, skal det indgå i prøven. Der skal bruges 10 ml (streg nr. 2). Afføringen må ikke være blandet med urin. Du skal undgå, at afføringen kommer uden på glasset.
2. Skru låget hårdt på prøverøret, når du er færdig.
3. Placer plasticrøret i transportrøret – skru låget godt på.
4. Læg prøven i plastikposen og opbevar den køligt, hvis du ikke sender den straks.
5. Læg følgesedlen og plastikposen med prøven i den forede konvolut og send med posten.

Svar på undersøgelsen

Det varer cirka en uge, før du får svar på undersøgelsen.

Torup Lægehus

Haldvejen 17, 1. sal, 3390 Hundested
(Ikke elevator)

Ligger 100 m fra Dyssekilde togstation.
Her foregår de fleste konsultationer.

Herlev Kirurgisk Klinik

Herlev Bygade 14, 1. sal, 2730 Herlev
(elevator)

Her foregår kikkertundersøgelserne
(gastroskopi og koloskopi) og enkelte konsultationer.

Telefon 4216 6046

Mail alice@MaveTarmSundhed.dk



Alice Højer Christensen

Overlæge med speciale i Medicinske
Mavetarmsygdomme og Intern Medicin, Ph.D.

© marits 2024