

Patientvejledning

Gastroskopi



MAVETARM
SUNDHED

Gastroskopi er en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Undersøgelsen kan afsløre sygelige forandringer i spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen, som for eksempel refluks, mavekatar, kræft eller mavesår. Til undersøgelsen bruger lægen et gastroskop, som er en tynd bøjelig slange på tykkelse med en lillefinger. Slangen føres gennem munden ned i spiserøret og maven og videre til tolvfingertarmen. Gastroskopi udføres på nogle steder via næsen. Det er ikke muligt i vores klinik på nuværende tidspunkt.


Forberedelse

Du skal møde ind på klinikken fastende. Det betyder, at du ikke må spise eller drikke 6 timer inden undersøgelsen. Indtil 2 timer før undersøgelsen må du drikke lidt vand, lys saftvand, te og kaffe. OBS. INGEN mælk.

Hvis du får livsvigtig medicin, må du godt tage den med et lille glas vand om morgenen. Tabletmedicin mod sukkersyge bør du vente med til efter undersøgelsen.

Hvis du tager mavesårsmedicin (Nexium, Omeprazol, Lanzoprazol, Pantoprazol), bør du undlade at tage det 1 uge før undersøgelsen, da

det letter muligheden for at påvise mavesårsbakterier. I stedet kan anvendes håndkøbsmedicin mod mavesyre (Acinil, Kuracid eller lignende). Hvis du tager blodfortyndende, bedes du kontakte klinikken, således at vi kan aftale om du skal holde pause nogle dage før din gastroskopi.



Undersøgelsen

SÅDAN FOREGÅR SELVE UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår i venstre sideleje efter en let lokalbedøvelse i svælget. Herved mindskes ubehagelige reflekser. Er du meget nervøs, kan du få beroligende medicin i en blodåre i armen, så du slapper af.

Hvis du har tandprotese, skal du fjerne den før din gastroskopi. Ved undersøgelsen bærer du tandbeskytter.

Du vil blive bedt om at synke, mens lægen fører gastroskopet gennem din mund og spiserør ned i mavesækken videre til tolvfingertarmen. Lægen tager nogle gange små vævsprøver (biopsier) til nærmere undersøgelse

samtidigt med, at undersøgelsen udføres. Du kan ikke mærke, at lægen tager vævsprøverne.

HVOR LANG TID TAGER EN GASTROSKOPI?

Selve gastroskopien varer ca. 5 minutter, og du vil umiddelbart efter undersøgelsen få en vurdering af lægen. Er der taget vævsprøver, foreligger svaret inden for 5-10 dage.

Efter undersøgelsen

BIVIRKNINGER VED EN GASTROSKOPI

Det gør som regel ikke ondt at få foretaget en gastroskopi, men det er lidt ubehageligt at få kikkertslangen gennem svælget og når der pumpes luft ned i mavesækken under undersøgelsen, kan det give en let trykkende fornemmelse og trang til at bøvs.

KOMPLIKATIONER

Undersøgelsen anses for sikker, og med en meget lille risiko (mindre end 0,1%) for komplikationer. Du kan få forbigående let svien i halsen eller luft i tarmene efter din gastroskopi.

OBSERVATION EFTER UNDERSØGELSE

Har du fået beroligende medicin under undersøgelsen, vil du som regel skulle observeres lidt, men ellers kan du gå hjem med det samme. På grund af lokalbedøvelsen må du ikke spise og drikke den første time efter din gastroskopi, da der ellers vil være risiko for fejlsynkning. Efterfølgende kan du genoptage normale aktiviteter. Har du fået beroligende medicin, må du ikke køre bil, cykle eller betjene farlige maskine samme dag.

MaveTarm og Sundhed

Ordrupvej 74A (Villa Vitalis), 2920 Charlottenlund

Telefon 4216 6046

Mail alice@MaveTarmSundhed.dk



Alice Højer Christensen

Overlæge med speciale i Medicinske
Mavetarmsygdomme og Intern Medicin, Ph.D.

© juli 2024